


## Коклюш и его профилактика

**Коклюш** – острая бактериальная воздушно-капельная инфекция, сопровождающаяся катаральными явлениями в верхних дыхательных путях и приступообразным спазматическим кашлем.



Несмотря на достигнутые успехи в области вакцинопрофилактики, коклюш остается актуальной проблемой **детской инфекционной патологии** в нашей стране и во всем мире. Ребенок восприимчив к коклюшу с первых дней жизни, поскольку полученные от матери противокклюшные антитела не дают достаточной защиты. Поэтому высокая заболеваемость регистрируется среди детей 1-го года жизни, у которых наиболее высок риск тяжелого течения и развития осложнений.



В этом возрасте после кашля часто бывают остановки дыхания, которые длятся от нескольких секунд до минуты и даже дольше! Количество приступов бывает до пятидесяти за сутки! **Любой раздражитель, будь то резкий звук, свет или приём пищи, может спровоцировать кашель.**

**Инкубационный период длится от 7 до 14 дней.** Заражение происходит воздушно-капельным путём. Больной заразен с 1-го до 25-го дня заболевания. Известно, что основным источником инфекции у детей данной возрастной группы являются члены семьи. **Самые низкие показатели заболеваемости отмечаются у детей в возрасте 2–4 лет, у которых курс вакцинопрофилактики против коклюша**



## На что следует обратить внимание родителям?

**В течение 1-2 недель** отмечается насморк, чихание, изредка умеренное повышение температуры **(38-38,5)** и кашель, который не уменьшается от противокашлевых средств.



Постепенно кашель усиливается, приобретает приступообразную форму, особенно ночью. **Начиная с третьей недели** начинается пароксизмальный период, в течение которого наблюдается типичный спастический кашель: серия из **5-15 быстрых кашлевых толчков**, сопровождающихся коротким свистящим вдохом. После нескольких нормальных вдохов может начаться **новый пароксизм**. Во время пароксизмов выделяется обильное количество вязкой слизистой стекловидной мокроты (обычно грудные и маленькие дети ее проглатывают, но иногда отмечается ее отделение в виде больших пузырей через ноздри). **Характерна рвота**, возникающая в конце приступа или при рвотных движениях, вызванных отхождением густой мокроты.

**При появлении вышеуказанных симптомов, следует немедленно обращаться к врачу для получения правильной тактики лечения.**

### Как же защитить ребенка от коклюша?



Конечно же - это **вакцинация**. Проводится она комбинированной вакциной. Прививаются детки с 2-х месяцев, ревакцинация в полтора года.

**Иммунитет после вакцинации защитит вашего ребенка от болезни или позволит перенести ее легко и без осложнений.**

Родители очень не любят эту прививку. Часто после проведения прививки у малыша поднимается температура, может держаться несколько дней. В результате родители отказываются от следующей прививки. И малыш становится не привитым и подверженным заболеванию. Конечно, никто не может заставить Вас дать согласие на прививку. Но подумайте, ведь сама болезнь, её осложнения, муки вашего ребенка несравнимы с банальной реакцией на прививку.